











Plan de management pour vaches laitières et veaux

Solutions pour les problèmes chez les vaches laitières et dans l'élevage de veaux

Pour quoi/contre quoi?	Avec quoi?	Quand?
Vache: fièvre laitière		
Comme poussée nutritive en calcium en cas d'hypocalcémie (la teneur en calcium dans le sang est trop faible)	CALZ-O-PHOS® Premium 4 bouteilles 	Page 23 1 ^{ère} bouteille 24 h avant le vêlage, même plus tôt en cas de forte montée de lait. 2 ^{ème} bouteille après le vêlage 3 ^{ème} bouteille 12 h après le vêlage 4 ^{ème} bouteille 24 h après le vêlage
Pour améliorer le rapport calcium- phosphore de la nourriture après l'infusion de calcium par le vétérinaire	CALZ-O-PHOS® Premium 2 bouteilles 	Page 23 1 ^{ère} bouteille 8 à 12 h après l'infusion 2 ^{ème} bouteille 24 h après l'infusion
Veau: premier ravitaillement après la naissance		
Peuplement de l'intestin avec des bactéries «positives»* et ravitaillement de la muqueuse avec la vitamine A.	PROBICOL®-K 20 ml = 1 injecteur 	Page 17 Aussitôt après la naissance. Avant le premier colostrum.
Colostrum en tant qu'abreuvement acidifié, plus de sécurité, incitation à l'appétit	SURLAC® 10 ml/litre de lait 	Page 15 Durant toute la phase d'abreuvement avec le colostrum.
Apport de fer (20 à 50% des veaux nouveaux-nés souffrent d'anémie par suite d'un manque de fer). Renforcement de la force de résistance	FERROVITAL®-K 10 ml = 1/2 injecteur 	Page 24 Après le premier colostrum.
Régulation de la digestion lors du passage du colostrum au lait de remplacement	AGROBAC®-K forte 25 g (1 sachet) par repas 	Page 12 1 jour avant et jusqu'à environ 1 semaine après le changement d'abreuvement.
Veau: végète, est affaibli, n'a pas d'appétit, est reconvalescent		
Peuplement de l'intestin avec des bactéries «positives»*; apport d'immunoglobulines, acides aminés, vitamines B et lécithine	GLOBUVIT®-K 25 g (1 sachet) par jour dans l'abreuvoir 	Page 16 Si le veau végète, est affaibli, n'a pas d'appétit, est reconvalescent.
Renforcement du système immunitaire	B-ORAL 10 - 30 ml par jour dans l'abreuvoir 	Page 20 Si le veau végète, est affaibli, est malade.

* Les bactéries «positives» améliorent l'équilibre de l'intestin en prenant la place des bactéries pathogènes.



Solutions pour les problèmes dans l'élevage de veaux

Pour quoi/contre quoi?	Avec quoi?	Quand?
Veau: Prophylaxie diarrhéique et diarrhée		
Régulation de la digestion en cas de stress (changement d'étable, d'alimentation etc.)	AGROBAC®-K forte 25 g (1 sachet) par repas 	Page 12 1 jour avant le stress et jusqu'à 1 semaine après.
Apport d'électrolytes et d'énergie, pas d'amaigrissement	SALYT®-K Ergeticum pour veaux 50 ml (1 ampoule) par repas 	Page 10 Directement dans le lait dès les premiers signes de diarrhée et jusqu'à la guérison.
Peuplement de l'intestin avec des bactéries «positives»*	PROBICOL®-K 20 ml = 1 injecteur 	Page 17 Dès les premiers signes de diarrhée.
Lait diététique de remplacement, muqueuse riche en électrolytes pour veaux diarrhéiques	AGRODIAR®-K forte 100 g (1 sachet) dans 2 litres d'eau 	Page 13 Si les additifs laitiers ne stoppent pas la diarrhée. Retirer le lait!
Apport d'électrolytes	AGROLYT®-K 25 g / 1 l d'eau, 1 l de solution pour chaque 10 kg de poids vif 	Page 11 Chez les veaux âgés ayant la diarrhée. Retirer le lait!

Solutions pour les problèmes chez les veaux achetés









Pour quoi/contre quoi?	Avec quoi?	Quand?
Prophylaxie diarrhéique et diarrhée		
Peuplement de l'intestin avec des bactéries «positives»*	PROBICOL®-K 20 ml = 1 injecteur 	Page 17 Aussitôt après l'arrivée. Avant le premier abreuvement.
Régulation de la digestion lors de la mise en étable et du changement d'abreuvement et en prévention de diarrhées.	AGROBAC®-K forte 25 g (1 sachet) par repas 	Page 12 Lors de la mise en étable, durant 5 jours à titre prophylactique.
Apport d'électrolytes et d'énergie, pas d'amaigrissement	SALYT®-K Ergeticum pour veaux 50 ml (1 ampoule) par repas 	Page 10 Directement dans le lait dès les premiers signes de diarrhée et jusqu'à la guérison.





Plan de management pour porcelets

Solutions pour les problèmes dans l'élevage de porcelets

Pour quoi/contre quoi?	Avec quoi?	Quand?
Premier ravitaillement après la naissance		
Peuplement de l'intestin avec des bactéries «positives»* et ravitaillement de la muqueuse avec la vitamine A.	PROBICOL®-F 2 ml = 1 pompage 	Page 26 Aussitôt après la naissance. Le cas échéant, répéter le 3 ^{ème} et 7 ^{ème} jour. À titre préventif contre la diarrhée dans les cheptels posant des problèmes.
Premier ravitaillement en vitamines A, D3, E, C	VITAMULGOL® 20 ml pour 10 porcelets 	Page 22 Aussitôt après la naissance.
Apport de fer (environ 100 % des porcelets nouveaux-nés souffrent d'anémie par suite d'un manque de fer), renforcement de la résistance	FERROVITAL®-F 2 ml = 1 pompage 	Page 25 Après le premier colostrum. Dans les premières 24 h de vie. Pour les porcelets qui sont pâles, faibles ou qui végètent, répéter entre le 8 ^{ème} et 12 ^{ème} jour.
Régulation de la digestion, apport d'électrolytes, soutien de la force de résistance	GLOBUVIT®-F 15 g le 1 ^{er} jour, ensuite 10 g dans le remplaçant de lait/dans l'eau 	Page 27 Si la truie ne produit pas assez de lait ou en cas d'élevage de porcelets sans mère.
Prophylaxie diarrhéique et diarrhée		
Apport d'électrolytes et d'énergie lors de diarrhées précoces, meilleure croissance. Pour porcelets tétants et lors du sevrage.	SALYT®-F Energeticum (Concentré liquide) comme solution (50 ml dans 2 litres d'eau) Dosage suivant l'âge. 	Page 29 Dès les premiers signes de diarrhée jusqu'à la guérison et pour augmenter la croissance: SALYT®-F comme solution dans de l'eau potable,
	AGROLYT®-F forte (poudre) comme solution (50 g = 1 sachet dans 2 litres d'eau) Dosage suivant l'âge. 	Page 28 ou AGROLYT®-F forte comme solution dans de l'eau potable.
Porcelet: végète, est affaibli, n'a pas d'appétit, est reconvalescent		
Renforcement du système immunitaire et apport de vitamines A, D3, E, C	VITAMULGOL® 20 ml pour 10 porcelets 	Page 22 Végète, pas d'appétit, malade, reconvalescent, stressé
Régulation de la digestion, apport d'électrolytes, soutien de la force de résistance, peuplement avec des bactéries «positives»*	GLOBUVIT®-F 15 g le 1 ^{er} jour, ensuite 10 g dans le remplaçant de lait/dans l'eau 	Page 27 Végète, pas d'appétit, malade, reconvalescent, stressé

* Les bactéries «positives» améliorent l'équilibre de l'intestin en prenant la place des bactéries pathogènes.